

que se presentan en verdaderas hordas. Esto no es así y precedidas por pequeños grupos o pájaros aislados llegan en oleadas ocupando zarzales, setos e incluso jardines. Una de las características que más llaman la atención del *Ampelis* es su extraordinaria mansedumbre, que hace pensar a muchas personas, observadores casuales y sorprendidos, en un jardín o parque público, que están ante un pájaro exótico escapado de una jaula. En muchas ciudades inglesas, suecas y alemanas, en los setos de parques públicos, de bordes de carreteras de gran tráfico, los *Ampelis* encuentran buenas previsiones de bayas y frutos permaneciendo indiferentes ante la proximidad del hombre. Esto ocasiona grandes pérdidas en sus efectivos a manos de portadores de escopetas de pequeño calibre, de aire comprimido e incluso de animales domésticos como los gatos. En los países escandinavos, escribe Bannerman citando a Collet, ya en 1872 los aldeanos que llegaban al mercado de Oslo llevaban las alforjas de sus caballerías llenas de *Ampelis*.

Como resumen de esta información diremos que afortunadamente y a pesar de la escasez de observadores, la llegada a Guipúzcoa de algunos de estos bellos invasores ha sido bien controlada y cualquier noticia sobre ocasionales observaciones en próximos inviernos será bienvenida.

Alfredo Noval

#### BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- BANNERMAN. D. «The Birds of British Isles», Vol. II. British Birds, Vol. 54-I. Enero 1961.  
 BIRDS, The R.S.P.B. Magazine, Vol. 1. V.  
 B. T. O. News, 13 y 14.  
 WITHERBPS Handbook of British Birds. Vol. I.

#### 66.—PRESENCIA DEL ALCAUDON DORSIRROJO (*LANIUS COLLURIO*) EN EL PAIS VASCO

Es sabido por todos los aficionados que el Alcaudón dorsirrojo —*Antzandobi bizkar-gorri*, en vascuence— es un pájaro que habita y nidifica en el Norte de la Península Ibérica y en gran parte de Europa: además, tiene la particularidad de que su migración se efectúa por la vía oriental, es decir, por la península balcánica, teniendo sus cuarteles de invierno en el Sur y Sudeste de Africa. Llega a nuestro país, en la primavera, por el Norte y marchando también hacia el Norte en el verano, al contrario de la mayoría de las demás aves, que emigran por la vía occidental y llegan en primavera por el Sur, marchando en otoño también en dirección Sur.

Por esta particularidad de su migración es prácticamente desconocido en el Centro y Sur de la península.

Quizá por sus costumbres, parecidas a la de les rapaces, o por alguna otra razón, ha interesado a nuestros colaboradores de la Sección y actualmente es una de las especies de que disponemos mayor número de fichas de nido, con datos interesantes sobre su nidificación.

Con estas líneas queremos animar a todos los aficionados a continuar con sus observaciones sobre estos Alcaudones, para poder comenzar un estudio monográfico sobre esta especie de nuestro país.

Sección de Ornitología.

#### 67.—LOCALIZACION EN GUIPUZCOA Y EN LUGARES CERCANOS DE NAVARRA DE LOS NYMPHALIDAE, *FABRICIANA ADIPPE* (L.), *MESOACIDALIA CHARLOTTA* (HW.) (=AGLAJA L.) Y *ARGYNNIS PAPHIA* (L.) LEPIDOPTEROS (MARIPOSAS)

Consultando los ejemplares de la Colección Científica de Guipúzcoa de las especies precitadas, cazadas en estos tres años de existencia de la Sección de Entomología, expongo a continuación las localidades y fecha de captura de estos grandes y vistosos NYMPHALIDAE, al parecer muy localizados en nuestra región, apareciendo todos ellos aproximadamente en las mismas fichas y lugares.

En todo el camino que va desde el Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu hasta las praderas de Urbía, en el macizo del Aitzgorri, desde una altura de 800 metros hasta los 1.100 metros, se cazaron en las siguientes fechas: julio de 1963, 15 de agosto de 1963, 7 de agosto de 1966 y 12 de agosto de 1966.

En Aralar, en su parte guipuzcoana de Igartzeta, se cogieron el 7 de agosto de 1966 para *F. adippe* (L.) y el 25 de julio del mismo año para *M. charlotta* (Hw.) y para *A. paphia* (L.).

En el valle de Leizarán, término municipal de Berástegui, en el lugar denominado Oicín, se cazaron *F. adippe* (L.) y *A. paphia* (L.) el 11 de agosto de 1963; a ambos lados de este lugar se encontraban también estas especies hasta las cercanías de Andoain.

En Aralar, en su parte navarra, en los alrededores de la Casa Forestal, situada a unos 1.000 metros, por una parte hasta San Miguel de Aralar y por la otra hasta el final del bosque de ha-

yas allí existente, atravesado por la carretera, fueron cazadas estas tres especies con profusión el día 10 de agosto de 1966 y además para *F. adippe* (L.) el 31 de julio de 1963.

En la carretera navarra que va de Estella al alto de Lizarraga (1.030 metros) encontramos estas especies sobre todo en el bosque de encinas, en las cercanías del kilómetro 14 de dicha carretera, vertiente sur de la Sierra, el 11 de julio de 1965 y el 18 de julio del mismo año.

Como nota complementaria cito la captura en el kilómetro 14 de la carretera de Estella a Lizarraga, el día 31 de julio de 1963, de un ejemplar de *A. paphia* (L.) forma *valesina* (Esp.) y el día 18 de julio de 1965 de un ejemplar *F. adippe* (L.) forma *cleodoxa* (O.).

C. Gómez de Aizpurua

Pte. de la Sección de Entomología  
San Sebastián, 26 de octubre de 1966.