

VILLAR, L.

1980. Catálogo florístico del Pirineo occidental español. *Publ. Centro Pir. Bol. Exp. Jaca*.

VIVANT, J.

1985. Herborisations dans le bassin moyen et inférieur de l'Adour. *Le Monde des Plantes*, 421-422 : 9-13. Toulouse.

WILKINSON, M.J. & STACE, C.A.

1985. The status of *Festuca ophioliticola* Kerguelen and related taxa. *Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occ. et Bass. Médit.*, 20: 69-73. Liege.

MUNIBE (Ciencias Naturales)	38	163-168	SAN SEBASTIAN	1986	ISSN 0027 .3414
-----------------------------	----	---------	---------------	------	-----------------

Recibido: 14 - 1 - 86

Riccia-generoa Euskal Herrian (1)

I. AIZPURU*

* Sociedad de Ciencias Aranzadi Zientzi Elkarte.
Plaza I. Zuloaga (Museo). 20003-Donostia.

Este artículo refleja el estado actual de los conocimientos que sobre la existencia y distribución de las especies del género *Riccia* se poseen en el País Vasco, dando cuenta de la presencia de *Riccia beyrichiana* Hampe ex Lehm. y *Riccia huebeneriana* Lindenb. por primera y segunda vez respectivamente.

(1) Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza. Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren laguntzari esker egiten ari den lana.

Euskal Herriko briofitoen ezaguera urria dugu oraindik, baina gure landaretza mota honen bilduma bat egitearen lehen urrats izateko asmoz, eman-gu dugu orain talodun hepatikoen artean espezetan ugariena den *Riccia* generoaren berri.

Europar zehar, hogeitahamabost espezie badi-tu genero honek (R. DUELL, 1983), Euskal Herrian, bibliografi eta herbarioak azterkatu eta egindako bilketaren ondorioz, zazpi besterik ez dira arkitu, eta hauek leku bakan batzutan gainera (1. Irudia).

Hau da beraz Euskal Herriko *Riccia*-ren bilduma: *Riccia beyrichiana* Hampe ex Lehm.

NAFARROA: Lezaun, Urbasa, 960 m. WN63.

Berria Euskal Herriako, txilardegi bateko lur hondartsuan arkitua.

Riccia ciliifera Link ex Lindenb.

NAFARROA BEHEREA; Bidarra, Errobi, 100 m., XN39.

P. ALLORGE (1941), ibai bazterreko arroka hondartsuetan, P. herbarioan ikusteko aukera iztin dugu. *Riccia glauca* L.

ARABA; Barambio, 300 m. WN06. GIPUZKOA: Itsasondo, 160 m. WN66. LAPURDI: Angelu, Brindos, 25m., XP11. NAFARROA BEHEREA: Banka, 250m., XN37.

G. DISMIER-ek arkitu zuen lehenengo Bankan (P Herb.), ANCIBOURE & PRESTAT (1918) berriz Angelun. Geroago, V. ALLORGE (1955) Itsasondo eta berrero Angelun, eta azkenik P. HERAS (1985) Araban.

Riccia huebeneriana Lindenb.

LAPURDI: Urruña, Txoldokogaina, 250m. XN09. NAFARROA: Ituren, Mendaur, 720 m., XN07.

Lehendabizi S. JOVET (1956) Txoldokogainako urtegian arkitu zuen (P. herb.); orain berriz Mendaurko urtegian azaldu da, ura jaitzikoan gelditzen den lohiaren gainean.

Riccia lamellosa Raddi

ARABA: Oion, 400 m., WN40.

P. HERAS (1985) da espezie honen aipamen bakarra eman duena.


Riccia michelii Raddi

LAPURDI: Biriatu, Lizarlan, 80 m., XN09. NAFARROA: Donamaria, Errekagorri, 160 m., XN07.

P. ALLORGE (1941) da lehenabizi aipatzen duena Donamarian; gero, V. ALLORGE (1955) argitaratzen du S. Jovet-ek Biriatur bildutakoa. Biak P herbarioan. *Riccia sorocarpa* Bisch.

BIZKAIA: Zeanuri, Gorbea, 1.400 m. WN16. GIPUZKOA: Oñati, Aloña, 1.300 m., WN46. LAPURDI: Angelu, 10 m., XP21.

V. ALLORGE (1955) Gipuzkorako eta S. JOVET (1956) Lapurdirako arkitu zuten lehenabizi (P herb.) eta azkenik, P. HERAS (1985) Bizkairako.



1. Irudia. Euskal Herriko mapa, 30 T ardatzean, 10 Km. aldeko UTM karratuetan kokaera zehaztuz: (*) *Riccia beyrichiana*, (▲) *Riccia ciliifera*, (*) *Riccia glauca*, (■) *Riccia huebeneriana* eta *Riccia michelii*, (●) *Riccia lamellosa* eta (▲) *Riccia sorocarpa*.

ESKERRONA:

Hainbeste lagundu didan Pariseko Kriptogarnia laborategiko zuzendari den S. Jovet Andereari.

BIBLIOGRAFIA

ALLORGE, P.

1941. Muscinées du Pays Basque. *Bull. Soc. Bot. France*, 88: 210-219. Paris.

ALORGE, V.

1955. Catalogue préliminaire des Muscinées du Pays Basque Français et Espagnol. *Rev. Bryol. Lichénol.* 24: 96-131. Paris.

ANCIBOURE & PRESTAT

1918. Catalogue des plantes de la région bayonnaise. Soc. Bayonnaise d'Etudes Regionaux. 85 p. Baiona.

DUELL, R.

1983. Distribución of the European and Macaronesian Liverworts (Hepaticophytina). *Byrolog. Beitrage.*, 2: 1-114. Duisburg.

HERAS, P.

1985. Primera aproximación al catálogo briológico de Alava. *Cuad. de Secc. Cienc. Nats. Eusko Ikaskuntza*, 2: 113-192. Donostia.

JOVET, S.

1956. *Deux Riccia* (hépatiques) nouveaux pour le Pays Basque Français. *B.C.E.R.S.* 1 (1): 139. Miarritze.

MUNIBE (Ciencias Naturales)	38	168-169	SAN SEBASTIAN	1986	ISSN 0027 - 3414
-----------------------------	----	---------	---------------	------	------------------

Recibido: 8 - 4 - 86

Eoxetomon (Insecta, Protura) generoaren bi espezieren Penintsulalberikarako Lehenengo Aipamenak

J. ALDABA*

* Departamento de Entomología. Sociedad de Ciencias Aranzadi. 20003-San Sebastián.

CONDE-k (1947) Iparraldean (Senpere) Eosentomon carolae Condé eta E. denisi Condé espezieak deskribatu zituen. Gaur arte beren banakera Iparraldeko zenbait lekutan soilik (Senpere, Sara, Kanbo) kokatu izan da. Geroztik TUXEN-ek (1964) E. wheeleri espeziearen sinonimiatzat bi hauek hartu zituen eta azkenik NOSEK-ek (1973) espezie-kategoria itzuli zien.

TUXEN-en (1964) sailkapenaren arabera bi espezie hauek «wheeleri» taldekoak dira. Talde sistematiko honen berezitasunak, besteak beste, hauexek dira: Neurri handiko prozesu esternala; Prozesu-buru leuna eta triangeluarra. Taldeko espezieen artean, IX-X tergitoen ketotaxia, BS indizearen balioa eta IX tergitoaren A1/A3 ceden erlazioa, berezitasun nagusiak dira bi espezie hauek desberdintzeko.

Guk hartutako laginek honoko konposaketa eta kokapena aurkezten dituzte: