

MUNIBE (Ciencias Naturales)	39	115-118	SAN SEBASTIAN	1987	ISSN 0027-3414
-----------------------------	----	---------	---------------	------	----------------

Recibido: 9-II-1987
Aceptado: 22-V-1987

Adiciones al *Catálogo florístico de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa* (Aseginolaza & al., 1984)

Additions to *Catálogo florístico de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa* (Aseginolaza & al., 1984)

PALABRAS CLAVE: Plantas vasculares, corología, Guipúzcoa, País Vasco.

Xabier LIZAU*
María R. SALAVERRIA*

RESUMEN

Se citan treinta plantas guipuzcoanas y una vizcaína de interés corológico para el País Vasco. Algunas son novedades provinciales o para un territorio más amplio; otras, las más, son especies raras en Guipúzcoa para las que se dan a conocer nuevas localidades.

LABURPENA

Gipuzkoako hogeitamar landare eta Bizkaiko baten aipamenak egiten dira, Euskal Herri mailan korologiarentzako adierazgarriak. Zena bait, Gipuzkoarako edo ta lurralde zabalago baterako lehen aldiz ezagutarazten dira; beste batzuk, gehienak, probintzia hartan aurretik ezagunak baina oso urriak izanik, egoitza berrietan azaltzen dira.

RESUME

Trente plantes de Guipuzcoa et une de Biscaye, d'intérêt chorologique pour le Pays Basque sont citées. Quelques unes sont des nouveautés provinciales ou pour un territoire plus vaste; d'autres, la plupart, ce sont des espèces rares en Guipuzcoa pour lesquelles sont données de nouvelles localités.

Damos a conocer en el presente trabajo algunas precisiones corológicas a la obra: *Catálogo florístico de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa* (ASEGINOLAZA, GÓMEZ, LIZAU, MONTSERRAT, MORANTE, SALAVERRIA, URIBE-ECHEBARRIA & ALEJANDRE, 1984). Son resultado de herborizaciones realizadas con posterioridad a la publicación de la misma. Las nuevas citas corresponden a la provincia de Guipúzcoa salvo una, que se indica de forma explícita, a Vizcaya.

Cada localidad se acompaña de sus coordenadas UTM; todas ellas corresponden a la zona 30T.

Las muestras se conservan en el Herbario S.C. Aranzadi (con excepción de los dos casos señalados en el texto).

Ophioglossum vulgatum L.

Usurbil: Aginaga, WN7491, 10 m; choperaliseda a orillas del Oria. Hernani-San Sebastián, WN8192, 70 m; robleal húmedo.

Dos nuevas localidades guipuzcoanas a añadir a las dos únicas conocidas hasta el presente en la provincia.

Quercus suber L.

Muy cerca de Arrona, término de Deba, WN5892, 70 m; en solana, sobre sustrato de margas y calizas arenosas.

Subsisten al menos un par de ejemplares en esta estación próxima al litoral, al Oeste de las de Zarautz y Getaria, donde se conservan numerosos rodales y ejemplares dispersos.

Cerastium semidecandrum L. subsp. *semidecandrum*

Beasain: Murumendi, WN6471, 790 m; suelos superficiales sobre calizas.

GEDILLA (1913: 559) indica que Heintz lo halló en Eskoriatza y BRAUN-BLANOUET (1967: 12) lo cita en un inventario tomado en Astigarribia.

* Sociedad de Ciencias Aranzadi, Plaza I. Zuloaga (Museo).
20003 San Sebastián.

Agrostemma githago L.

Aretxabaleta, WN4063, 400 m; en campo de alfalfa y cebada.

No conocemos citas guipuzcoanas anteriores.

Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte (*C. bulbosa* (L.) DC.)

Azkoitia, WN5476, 540 m; en claro de hayedo éútrofo.

En el «Catálogo» se dan dos localidades guipuzcoanas en los montes de la divisoria de aguas cántabro-mediterránea y algunas más en las montañas de la mitad oriental de Alava. BASCONES (1978:97) la indica en los hayedos calcícolas de la mitad norte de Navarra: Sierra de Aralar, etc.

Arabis turrita L.

En Oñati: Araotz, WN46, sobre calizas, la recolectó J.A. Aperribai, pliego que hemos tenido la oportunidad de ver.

Para Guipúzcoa, sólo se conocía la cita de esta planta en Eskoriatza (GANDOGGER, 1917:15).

Cochlearia danica L.

Zarautz, WN6693, 10 m; fisuras de muro (piedra caliza) rociado con frecuencia por el agua marina. (Leg.: J.L. Terés).

No existen citas guipuzcoanas anteriores aunque se conoce de algunos puntos de la costa vizcaína. También se señala en el litoral labortano, como en Boucau (BLANCHET, 1891:14) y Béhobie (ANCIBURE & PRESTAT, 1918:15).

Thlaspi arvense L.

Zarautz, WN6892, 10 m; en terreno alterado y removido (Leg.: J.L. Terés).

Si bien Martínez (GREDILLA, 1913), Arizaga (GREDILLA, 1914-15) y LOSA (1946) dan algunas localidades alavesas, y GANDOGGER (1917:30), una guipuzcoana, Eskoriatza, no existían citas posteriores.

Astragalus glycyphyllos L.

Gabiria: Aztiria, WN5665, 600 m. Legazpia: Brinkola, WN5461, 500 m. Setos en el ambiente del roble.

Se conocía una localidad guipuzcoana, Heintz (GREDILLA, 1913: 551): Eskoriatza. Es planta muy rara en toda la vertiente cantábrica del País Vasco.

Epilobium lanceolarum Sebastiani et Mauri

Plaentzia, WN4582, 300 m; en talud, sobre basaltos.

Cuenta con escasas y dispersas localidades en las tres provincias.

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby

Aretxabaleta: barranco del Urkulu, WN4262, 380 m. Oñati: Araotz, WN4560, 460 m. Sobre suelos esqueléticos secos y pedregosos (calizas).

Localidades cercanas a las dos conocidas de Guipúzcoa en su extremo suroccidental. Aunque se encuentra extendido por la vertiente mediterránea del País Vasco, en el área guipuzcoana es por el contrario puntual en algunos enclaves del ambiente de la encina o de los robles calcícolas.

Coris monspeliensis L.

Gabiria, WN 5867, 430 m; pasto-matorral basófilo derivado de encinar, en solana margo-caliza.

Localidad notable en plena vertiente cantábrica, pues aun siendo común en la vertiente mediterránea del País Vasco, las montañas guipuzcoanas de la divisoria de aguas —fuerte barrera climática— parecían insalvables para esta especie. No hay citas provinciales anteriores. En Vizcaya se da solamente del extremo suroccidental (área de Orduña y entre Balmaseda y Gijano).

Cicendia filiformis (L.) Delarbre

Gabiria, WN5567, 480 m; en terreno silíceo y sobre suelo arenoso muy húmedo a orillas de un canalillo de drenaje.

BRAUN-BLANQUET (1967: Tab. 14) señala esta planta en Otzaurte y ALLORGE (1941: 322) indicó la existencia de Cicendia, sin precisar más, en Jaizkibel.

Heliotropium europaeum L.

Hemos podido ver un pliego de esta planta recolectada en Bergara, WN47, por J. A. Aperribai.

Muy rara en toda la vertiente cantábrica vasca. No existían citas guipuzcoanas anteriores.

Srachys recta L.

Vizcaya: Markina, carretera a Murelaga, WN3990, 20 m; calizas en claro de encinar.

Del Monte Anboto (GANDOGGER, 1917: 254) es la única cita anterior existente para Vizcaya. Resulta más frecuente hacia la parte oriental del País Vasco.

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

Mutiloa-Zerain, WN56, 400 m; en terreno alterado al borde de la carretera, sustrato calizo.

En el «Catálogo» no dimos referencias bibliográficas para esta especie al considerar la posibilidad de confusiones con *Acinos alpinus* (L.) Moench. Sin embargo, por lo que respecta a Guipúzcoa, BRAUN-BLANQUET (1966: 139) (1967: 62, Tab. 23, Tab. 24) la citó en sus inventarios de varias localidades; también la dan GANDOGGER (1917: 242) y LOIDI (1983: 155).

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

Gabiria, WN56, 300 m. Beasain, WN6365, 230 m. Ribazos y terrenos alterados en bordes de caminos y carreteras.

De Guipúzcoa se conocían con anterioridad dos localidades.

Lonicera etrusca G. Santi

Oñati: Araotz, WN4560, 400 m y WN4461, 750 m; setos en el ambiente del robledal calcícola.

La única referencia guipuzcoana anterior es de ARNAIZ & LOIDI (1981: 70) en un inventario levantado en la localidad costera de Saturrarán.

Scabiosa atropurpurea L. (S. maritima L.)

Beasain: WN6466, 170 m y WN6467, 400 m. San Sebastián, WN8296, 10 m. Observada también en Lasarte. Siempre en márgenes de caminos y carreteras.

DEVESA (1984: 179): Plaentzia (Bourgeau). No se conocían otras localidades en Guipúzcoa, donde al parecer se encuentra en expansión.

Bombycilaena erecta (L.) Smolj.

Ataun, WN6858, 580 m; en suelo esquelético, seco y soleado de una colina caliza.

En toda la vertiente cantábrica del País Vasco es planta muy puntual y localizada. En Guipúzcoa, GANDOGGER (1917: 187) la citó de Eskoriatza.

Gnaphalium luteo-album L.

Aretxabaleta, WN4263, 350 m; terrenos removidos en las orillas del embalse de Urkulu.

Segunda localidad guipuzcoana.

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter

Hondarribia, WN9398, 70 m; borde de carretera. Segunda localidad guipuzcoana.

Centaurea scabiosa L.

Gabiria: Aztiria, WN5665, 600 m; en margen herboso de camino.

Es planta frecuente al Sur de la divisoria de aguas y rara al Norte de la misma, de donde se conocen escasas localidades.

Lactuca tenerrima Pourret

Mutriku, WN4894, 240 m; terreno pedregoso y despejado en ambiente de encinar cantábrico calcícola.

Se conoce de algunos puntos de la vertiente cantábrica vasca.

Asphodelus fistulosus L.

Orio, WN7193, 5 m; en el arenal ya muy alterado, de la anteplaya.

De la misma localidad poseíamos un pliego de planta inmadura que determinamos como *A. cf. fistulosus* y que no se dio en el «Catálogo». El material recolectado el 11-V-1986 por indicación de J. Elorza, no deja lugar a dudas.

LAINZ (1953: 156) señala el hallazgo de esta especie en Vizcaya por el Hno. Elías. ONAINDIA (1986: 193) la cita de Carranza (Vizcaya). No existen otras referencias en las tres provincias.

En la región de Baiona (Anglet, Boucau) la señalaron BLANCHET (1891: 134) y ANCIBURE & PRESTAT (1918: 56).

Allium paniculatum L.

Plaentzia, subiendo a Muneta, WN48, 500 m; formando una vistosa colonia en el margen de la carretera.

Primera localidad guipuzcoana.

Allium stearnii Pastor et Valdés

Bergara, WN4673, 280 m; ruderal en borde de camino.

No existen citas anteriores para la vertiente cantábrica del País Vasco.

Carex pseudocyperus L.

Mutriku, WN5194, 120 m; sobre suelo permanentemente encharcado, en el borde de una aliseda.

No hay citas anteriores en Guipúzcoa. Es planta muy rara en todo el País Vasco.

Epipactis helleborine (L.) Crantz

Mutriku, WN4894, 150 m; en pinar de repoblación (*P. radiata*) con sotobosque de helecho común.

Se conocen pocas localidades de esta orquídea nemoral en la vertiente cantábrica vasca. Llama la atención hallarla en el ambiente citado.

Coeloglossum viride (L.) Hartman

Berastegi, WN8374, 500 m; prado sobre sustrato calizo.

En el «Catálogo» lo citamos únicamente de las Sierras de Aizkorri y Aralar, por encima de los 1.300 m.

Orchis ustulata L.

Beasain, subiendo a Murumendi, WN67,650 m. Tolosa, WN7277, 700 m. Berastegi, WN8374, 500 m. Prados y pastos sobre sustrato básico.

Rara en toda la vertiente cantábrica del País Vasco.

BIBLIOGRAFIA

ALLORGE, P.

1941. Essai de synthèse phytogéographique du Pays Basque. *Bull. Soc. Bot. France* 88: 291-356.

ANCIBURE, E. & E. PRESTAT.

1918. *Catalogue des plantes de la région bayonnaise*. 85. pgs. Société Bayonnaise d'Etudes Régionales. Bayonne.

ARNAIZ, C. & J. LOIDI.

1981. Estudio fitosociológico de los zarzales del País Vasco (*Rubus ulmifolii*-*Tametum communis*). *Lazaroa* 3: 63-73.

ASEGINOLAZA, C., D. GOMEZ, X. LIZAU, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M.R. SALAVERRIA, P.M. URIBE-ECHEBARRIA & J.A. ALEJANDRE.

1984. *Catálogo florístico de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa*. 1150 pgs. Gobierno Vasco. Viceconsejería de Medio Ambiente. Vitoria.

BASCONES, J.C.

1978. *Relaciones suelo-vegetación en la Navarra húmeda del Noroeste. Estudio florístico-ecológico*. Tesis doctoral (inéd.). Universidad de Navarra.

BLANCHET, M.

1891. *Catalogue des plantes vasculaires du Sud-Ouest de la France, comprenant le département des Landes et celui des Basses-Pyrénées*. 190 pgs. Impr. Lasserre. Bayonne.

BRAUN-BLANQUET, J.

1966. Vegetationsskizzen aus dem Baskenland mit Ausblicken auf das Weitere Ibero-Atlantikum. I Teil. *Vegetatio* 13: 117-147.

BRAUN-BLANQUET, J.

1967. Vegetationsskizzen aus dem Baskenland mit Ausblicken auf das Weitere Ibero-Atlantikum. II Teil. *Vegetatio* 14: 1-126.

DEVESA, J.A.

1984. Revisión del género *Scabiosa* en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Lagascalia* 12 (2): 143-212.

GANDOGGER, M.

1917. *Catalogue des plantes recoltées en Espagne et en Portugal pendant mes voyages de 1894 à 1912*. 378 pgs. Hermann, Lhomme, Masson libraires. Paris.

GREDILLA, A.F.

1913. Corografía botánica. In: F. Carreras y Candi, *Geografía general del País Vasco-Navarro* Vol. País Vasco-Navarro: 459-567. A. Martin. Barcelona.

GREDILLA, A.F.

- 1914-15. *Itinerarios botánicos de Dn. Javier de Arizaga. Biografía de Dn. Javier de Arizaga y relación detallada de dos nuevos manuscritos botánicos*. 481 y 354 pgs. Diputación Foral de Alava. Vitoria.

LAINZ, M.

1953. Adiciones inéditas del P. Baltasar Merino a su «Flora de Galicia» *Broteria, Sér. Ciénc. nat.* 22: 155-168.

LOIDI, J.J.

1983. *Estudio de la flora y vegetación de las cuencas de los ríos Deva y Urola en la provincia de Guipúzcoa*. 298 pgs. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.

LOSA, T.M.

1946. *Contribución al estudio de la flora de Alava. Noticia de algunas plantas que viven en la Sierra de Cantabria*. 78 pgs. Diputación Foral de Alava. Vitoria.

ONAINDIA, M.

1986. *Ecología vegetal de las Encartaciones y Macizo del Gorbua (Vizcaya)*. 271 pgs. Universidad del País Vasco. Bilbao.